

کوئتیپین (با نام تجاری ترانکوپین) یک داروی ضد سایکوز است که برای درمان اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی، و همراه با یک داروی ضد افسردگی برای درمان اختلال افسردگی اساسی تایید شده است. این دارو به صورت قرص های ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی در دسترس می باشد.

### راهنمای مصرف:

- \* این دارو را کاملا طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- \* هرگز این دارو را بیشتر از مقدار و مدت تجویز شده مصرف نکنید.
- \* پزشک شما ممکن است برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید، دوز داروی شما را تغییر دهد.
- \* این دارو را با لیوانی پر از آب مصرف کنید.
- \* از له کردن، جویدن و شکستن قرص اجتناب کنید.
- \* قرص را به صورت کامل بلعید.

\* کوئتیپین را در مکانی به دور از رطوبت و گرما قرار دهید و از دسترس کودکان دور نگه دارید.

### فراموش کردن دوز مصرفی:

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن دارو را میل کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف کنید و از دوبرابر کردن دارو خودداری کنید.

### تداخلات دارویی:

کوئتیپین با داروهایی چون سایمتیدین، لورازپام، ریفامپین، آنتی بیوتیک ها، فلوکستین، هالوپریدول، ایمی پرامین، داروهای درمان فشار خون بالا یا بیماری های قلبی، داروهای ضد تشنج مانند: فنوباریتال، فنی توئین تداخل دارویی دارد. البته ممکن است داروهای دیگری نیز وجود داشته باشند که با کوئتیپین تداخل پیدا کنند. درباره تمام داروهای


بدون نسخه و یا با نسخه ای که مصرف می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

این توصیه، داروهای گیاهی، ویتامین ها و دیگر داروها را نیز دربر می گیرد. هیچ داروی جدیدی را بدون مشورت با پزشک خود مصرف نکنید.

### عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک مانند کهیر، مشکلات تنفسی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو، تغییرات خلقی یا رفتاری، اضطراب، حملات هراس، مشکلات خواب پرخاشگری، بیقراری، بیش فعالی (جسمی - روانی) و افسردگی شدید می تواند در مصرف این دارو، ایجاد شود.

البته لازم به ذکر است که اغلب این عوارض، در ابتدای درمان با دارو، دیده می شود و به مرور نسبت به آنها تحمل ایجاد می شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

راهنمای مصرف کوئیتیاپین

دفتر پرستاری

سوپروایزر آموزشی فریبا فقهی




داروهای سرماخوردگی یا آلرژیک، مخدرها (نارکوتیک ها)، قرص های خواب آور، داروهای شل کننده عضلانی، داروهای ضدصرع و اضطراب ممکن است خواب آلودگی ناشی از مصرف این دارو را افزایش دهند.

اگر شما به طور منظم از این داروها و یا هر داروی دیگری استفاده می کنید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.



منبع: وزارت بهداشت، معاونت غذایی و دارویی (۱۳۸۹). دارونامه رسمی ایران. تهران: نشر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یاسوج - میدان امام حسین - مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی



اگر با مصرف داروها مشکلی دارید، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید.

### موارد احتیاط

هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که به هوشیاری و آگاهی نیاز دارد، احتیاط کنید.



از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی بلند شدن سریع از حالت نشسته یا خوابیده پرهیز کنید زیرا ممکن است باعث سرگیجه بشود.

از نوشیدن الکل اجتناب کنید زیرا می تواند عوارض جانبی این دارو را افزایش دهد.

