

است قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک مشورت کنید و تاریخچه مصرف دارویی خود را بطور کامل به اطلاع پزشک برسانید.



لطفا به موارد زیر توجه نمایید:

\* مصرف همزمان کاربامازپین با داروهای ضد بارداری باعث کاهش اثر داروی ضد بارداری می شود.

\* در مصرف همزمان کاربامازپین و سایمتیدین، اثر دارویی کاربامازپین افزایش می یابد و منجر به مسمومیت با کاربامازپین می شود.

\* در مصرف همزمان با الكل و خواب آور ها، باعث افزایش اثر الكل و خواب آورها می شود.

\* مصرف همزمان کاربامازپین و والپروات سدیم یا اسیدوالپروئیک بایستی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود

## برخی از عوارض جانبی کاربامازپین

یبوست، سرگیجه خفیف یا خواب آلودگی، گیجی، دو بینی، تهوع و استفراغ، سر درد، مشکل در به خواب رفتن، خشکی دهان و افزایش حساسیت به نور خورشید از عوارض جانبی دارو می باشد.

در صورت بروز هر یک از موارد زیر باید سریعاً به پزشک

مراجعه کنید:

خونریزی غیر معمول، برقان، تیره شدن رنگ ادرار، مدفوع کم رنگ، درد شکمی، تب، لرز، گلودرد، کبود شدن بی دلیل پوست و زخم دهان و اختلال در هوشیاری و تعادل.

نکته: جهت کاهش خشکی دهان می توان از آدامس ها و آب نباتی های بدون قند استفاده نمود. به منظور کاهش پوسیدگی دندان ها، باید بهداشت دهان و دندان به طور مناسب رعایت شود.

## تداخل کاربامازین با سایر داروها

مصرف بعضی از داروها به همراه کاربامازپین باعث تغییرات اثرات دارو می شود که می تواند خطرناک نیز باشد. لذا لازم

کاربامازپین دارویی است که در درمان تشنج و اختلالات خلقی کاربرد دارد. برخی این دارو را با نام تگرتوول می شناسند.

استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر می باشد و نباید زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع شود.

کاربامازپین به شکل قرص های ۲۰۰ میلی گرمی و ۴۰۰ میلی گرمی و شربت موجود می باشد.

کاربامازپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییرات ماندگار و دائمی نیستند بلکه بعلت حضور فعال ماده در بدن ایجاد شده، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

## راهنمای مصرف کاربامازپین



دفتر پرستاری

سوپر وایزر آموزشی فریبا فقهی

\* این دارو می تواند باعث افزایش حساسیت به نور شود. دوره درمان با کاربامازپین از قرار گرفتن طولانی مدت در برابر نور خورشید خودداری نمایید و از کرم ضد آفتاب، عینک آفتابی و پوشش کامل استفاده نمایید.

\* در صورت داشتن مشکلات کبدی و کلیوی قبل از مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.

\* در صورت فراموش کردن یک دوز دارو از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری شود.

\* در صورت بارداری و یا تمایل به بارداری قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

\* از آنجا که کاربامازپین در شیر مادر ترشح می شود، لازم است در صورت شیردهی، قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع کنید.

منبع: دارونامه رسمی ایران مولف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، معاونت غذایی و دارویی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید رجایی بهشتی

یاسوج - میدان امام حسین - مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

## نکات قابل توجه در مصرف دارو



- \* دارو را در جای خنک و خشک نگهداری کنید.
- \* برای جلوگیری از اختلالات گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی مساوی مصرف کنید.
- \* مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.

\* مصرف این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی، سرگیجه و تاری دید شود. در هفته اول درمان و در موارد افزایش مقدار مصرف، از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری دارند، خودداری کنید.

\* در زمان مصرف دارو به طور منظم به پژوهشگاه مراجعه کنید تا بتواند بهبودیتان را زیر نظر داشته باشد، ممکن است لازم باشد برای تعیین سطح دارو و جلوگیری از مسمومیت دارویی، آزمایش دهید.

\* از مصرف الكل در طی درمان با کاربامازپین خودداری نمایید.

\* از مصرف گریپ فروت در دوره درمان با کاربامازپین خودداری نمایید.