

کلوزاپین چیست؟

کلوزاپین (کلوزاپین) یک داروی ضد روان پریشی است. این دارو با تغییر دادن عملکرد مواد شیمیایی در مغز کار می کند. کلوزاپین برای درمان شیذوفرنی (اسکیزوفرنی) شدید یا برای کاهش خطر تمایلات مربوط به خودکشی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا سایر اختلالات مشابه استفاده می شود.

دیگر نام های تجاری این دارو عبارتند از:

- FazaClo
- Versacloz
- Clopine
- CloZAPine
- Synthon
- Denzapine
- Zaponex

اثرات جانبی شایع کلوزاپین

- افزایش وزن
- لرزش، سرگیجه، احساس چرخش محیط
- سردرد، خواب آلودگی
- تهوع، یبوست
- دهان خشک یا افزایش بزاق
- تاری دید
- ضربان قلب سریع، افزایش تعریق

در صورت فراموش کردن مصرف دارو

نوبت از دست رفته دارو را به محض یادآوری، مصرف کنید. اگر تقریباً نزدیک به زمان مصرف دوز برنامه ریزی شده بعدی هستید، از مصرف مقدار از دست رفته چشم پوشی کنید. برای جبران کردن دوز از دست رفته، داروی اضافی مصرف نکنید. اگر بیش از دو روز متوالی نتوانستید دارو را مصرف کنید، قبل از شروع دوباره مصرف آن، با پزشک خود تماس بگیرید.

قبل از مصرف کلوزاپین

اگر تا به حال حین مصرف این دارو دچار عفونت یا واکنش شدید آلرژیک شده اید، نباید از کلوزاپین استفاده کنید.

استفاده از کلوزاپین برای شرایط روانی مرتبط با دمانس (زوال عقل) تایید نشده است. کلوزاپین ممکن است در سالمندانی با شرایط مرتبط با دمانس (زوال عقل)، خطر مرگ را افزایش دهد.

برای اطمینان از مضر نبودن کلوزاپین برای شما، در صورت داشتن موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید.

- بیماری قلبی، فشار خون بالا، یا سابقه حمله قلبی یا سکته (شامل حمله ایسکمیک گذرا)؛ سکته کوچک مغزی؛
- سابقه شخصی یا خانوادگی سندرم طولانی (نوعی اختلال فعالیت الکتریکی قلب)؛ QT

- کلسترول یا تری گلیسیرید بالا
- انسداد روده ای به نام فلج ایلئوس؛
- بیماری کبدی یا کلیوی؛
- پروستات بزرگ یا مشکلات ادراری؛
- گلوکوما یا آب سیاه
- سوء تغذیه یا کم آبی بدن
- مصرف سیگار

نحوه مصرف کلوزاپین

کلوزاپین را دقیقاً مطابق با تجویز پزشکتان استفاده کنید. از همه دستورات و راهنمایی های نسخه تجویز شده پیروی کنید. ممکن است گاهی پزشکتان، دوز مصرفی داروی شما را تغییر دهد. این دارو را در مقادیر بیشتر یا کمتر و یا طولانی تر از میزان توصیه شده، استفاده نکنید. کلوزاپین را می توان با غذا یا بدون آن مصرف کرد.

کلوزاپین می تواند به ویژه در زنان و سالمندان، و افرادی که دچار سوءتغذیه یا مشکلات جدی پزشکی اند، گلبول های سفید خون را که به مبارزه با عفونت ها کمک می کنند، کاهش دهد. در این حالت ابتلای شما به یک عفونت جدی یا تهدید کننده حیات آسان تر می شود. اغلب نیاز خواهد بود که آزمایش خون بدهید. بر اساس نتایج این آزمایشات، درمان های آینده شما ممکن است به تأخیر بیفتد. اگر جراحی در پیش رو دارید، زودتر به جراحان اطلاع دهید که از کلوزاپین استفاده می کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج
مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

راهنمای مصرف کلوزاپین



دفتر پرستاری

سوپروایزر آموزشی فریبا فتهی

در طول مصرف کلوزاپین از چه مواردی باید خودداری کرد؟

کلوزاپین می تواند موجب سرگیجه شدید، ضربان قلب کند، غش یا تشنج شود. از این دارو بیشتر از مقدار توصیه شده، استفاده نکنید. اگر رانندگی میکنید یا هرکاری که نیازمند هوشیاری و وضوح دید است انجام میدهید، مراقب باشید. نباید از وضعیت نشسته یا درازکش خیلی سریع بلند شوید وگرنه ممکن است احساس سرگیجه کنید. سرگیجه یا خواب آلودگی شدید می تواند موجب افتادن، شکستگی و یا آسیب های دیگر شود..

از نوشیدن الکل خودداری کنید. عوارض جانبی خطرناکی می تواند رخ دهد.

یاسوج - میدان امام حسین - مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

در صورت دچار شدن به موارد زیر، فوراً با پزشکتان تماس

بگیرید :

درد قفسه سینه، مشکل تنفسی، لرزش در قفسه سینه، علائم عفونت (ضعف، تب، گلودرد، علائم سرماخوردگی و یا آنفولانزا)، یا احساس بیهوش شدن ناگهانی

کلوزاپین می تواند موجب سرگیجه شدید، ضربان قلب کند، غش یا تشنج شود. از این دارو بیشتر از مقدار توصیه شده، استفاده نکنید.

استفاده از کلوزاپین برای شرایط روانی مرتبط با دمانس(زوال عقل) تایید نشده است. ممکن است کلوزاپین در سالمندان وابسته به دمانس(زوال عقل)، خطر مرگ را افزایش دهد.

کلوزاپین فقط در داروخانه های معتبر و تحت شرایط ویژه ای در دسترس است