



داروی کلوزاپین

ویژه بیماران/همراهان

تهیه کننده: کوثر کریمی جو سوپروایزر آموزشی بیمارستان
شهید رجایی یاسوج

کد: PA.05.00

۱۲- برای خشکی دهان فرد می تواند آن را با جویدن

آدامس بدون قند و یخ بهبود بخشد.

۱۳- افزایش وزن که نیاز به کنترل غذا دارد.

۱۴- در مبتلایان به صرع و کسانی که در حال ترک الکل هستند باید به پزشک اطلاع دهند و با احتیاط مصرف شود.

۱۵- از مصرف هرگونه دارو به صورت خودسرانه
خودداری نمایید

۱۶- از قطع ، کم و یا زیاد کردن دارو بدون دستور
پزشک خودداری نمایید.

شماره تلفن بیمارستان

۰۷۴۳۳۲۲۲۹۱

۰۷۴۳۳۲۲۲۹۲

و برای باردار شدن با پزشک مشورت

شیردهی قبل از مصرف دارو
مشورت کنید .

ر گرفتن طولانی مدت این دارو در هوای
گرم خودداری نمایید و به میزان کافی مایعات
استفاده نمایید

۸- دوره درمان با این دارو باید کامل شود این
دارو نباید بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده
مصرف شود .

۹ - در صورت عدم مصرف این دارو به مدت 2
روز یا بیشتر، قبل از مصرف با پزشک خود
مشورت کنید.

۱۰- در آغاز درمان به دلیل افت فشارخون بیمار
باید تحت مراقبت باشد .

۱۱- افت فشارخون وضعیتی است یعنی کاهش
در هنگام تغییر وضعیت که این عارضه بیشتر در
ابتدای درمان است به همین جهت در روزهای
اول نباید به صورت ناگهانی از رختخواب بلند

لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

۱- سیگار کشیدن سطح خونی کلوزاپین را کاهش می دهد و باعث کم شدن اثر درمان می شود .



۲- بدون

اجازه پزشک

دارو را قطع

نکنید.

۳- از نوشیدن الکل پرهیزید . الکل خواص خواب آلودگی این دارو را افزایش می دهد.

۴- اگر یک نوبت از مصرف این دارو را فراموش کردید ، به محض یادآوری آن را بخورید اگر نوبت بعدی نزدیک است نوبت فراموش شد را رها کنید و به برنامه منظم دارویی تان برگردید و میزان مصرف بعدی را بیشتر نکنید

عوارض داروی کلوزاپین:

احتباس ادرار ، تشنج ، افزایش وزن ، آبریزش از دهان در شب شدیدتر است ، خشکی دهان ، تاری دید ، یبوست ، احتباس ادرار ، سرگیجه افت فشارخون وضعیتی است یعنی کاهش فشارخون فرد در هنگام تغییر وضعیت که این عارضه بیشتر در ابتدای درمان است، خواب آلودگی ، سردرد ،

ضعف ، تهوع و استفراغ ، اسهال ، عوارض قلبی ، تب ، زخم گلو ، خستگی ، زخم غشاء مخاطی سریعاً به

پزشک اطلاع دهید.



داروی کلوزاپین :

نکته قابل توجه : درمان با داروی کلوزاپین معمولاً

در بیمارستان شروع می شود و بیمار تحت نظر قرار می گیرد زیرا (عارضه جانبی آن کاهش شدید گلبول سفید می باشد) که لازم است قبل از شروع دارو آزمایش خون انجام شود.

آزمایش خون جهت بررسی گلبول های سفید هر هفته و در شش ماه دوم هر ۲ هفته و بعد از آن هر ماه انجام می شود .

