




داروی لاموتریزن



ویژه بیماران/همراهان

۱۴۰۴

تهیه کننده: کوثر کرمی جو سوپروایزر آموزشی بیمارستان
شهید رجایی یاسوج

تایید کننده: آقای دکتر قادرزاده باقری

روانشناس بالینی

کد: PA01200

در صورتی علائمی مانند از هوش رفتن و مشکلات تنفسی را
مشاهده کردید سریعاً با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید. یابره
پزشک مراجعه کنید

علائم مصرف بیش از حد این دارو: شامل خواب آلودگی شدید،
حرکات غیر طبیعی مردمک چشم و از دست دادن هوشیاری
میباشد.



منابع: کتاب دارونامه رسمی ایران- مولف: وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

شماره تلفن بیمارستان

۰۷۴۳۳۲۲۲۲۹۱

۰۷۴۳۳۲۲۲۲۹۲

۵



بیماران با نارسایی کبد، کلیه و یا قلب با احتیاط مصرف گردد.

در صورت بروز تب، بثورات جلدی، علائم شبه آنفلوانزا تورم غدد
لنفوی یا تشنج حتماً به پزشک مراجعه شود..

مصرف داروی لاموتریزن در دوران بارداری ممکن است خطر ایجاد
شکاف لب و شکاف کام را در نوزاد افزایش دهد.

بانوان محترم اگر تصمیم به بارداری دارید یا در طی دوره مصرف
دارو باردار شده اید، به پزشک خود اطلاع دهید..

به دلیل ترشح دارو در شیر مادر، مصرف دارو در شیردهی توصیه
نمی شود.

۴

مددجو/ همراه گرمی: با آرزوی سلامتی برای شما توجه داشته باشیم که بیماری های روح و روان نیز مانند بیماری های جسم نیاز به درمان و مراقبت دارند. مطالب فوق به منظور آشنای شما با مصرف داروی لاموتریژن میباشد. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

داروی لاموتریژن

لاموتریژن یک داروی ضد تشنج با اثر ضد افسردگی است که به تنهایی یا همراه با دیگر داروهای ضد تشنج برای درمان صرع تجویز میگردد. همچنین گاهی دارو به عنوان درمان نگهدارنده دراختلال دو قطبی مصرف می شود.

اشکال دارویی

به صورت قرص های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ میلی گرمی می باشد.

توجه مصرف دارو طبق دستور پزشک

باشد خودسرانه قطع یا کم وزیاد نشود.



برخی از عوارض جانبی لاموتریژن:

لاموتریژن برخی عوارض جزئی دارد که بیشتر آنها با تنظیم مقدار دارو برطرف می شوند. لاموتریژن ممکن است موجب بروز بثورات پوستی و بخصوص طی شش هفته اول درمان شود. اگرچه بثورات پوستی ممکن است با ادامه درمان برطرف شود ولی آن را فوراً به پزشک اطلاع دهید، زیرا ممکن است قطع مصرف دارو ضروری باشد

بثورات جلدی، تب، علایم شبه آنفلوآنزا، خواب آلودگی، اختلال در عملکرد کبد، کاهش میزان پلاکت خون، حساسیت به نور، اختلالات بینایی، گیجی، عدم تعادل، خستگی، اختلالات گوارشی و تحریک پذیری از عوارض جانبی این دارو هستند. البته لازم به ذکر است که اغلب این عوارض، در ابتدای درمان با دارو دیده می شود و به مرور نسبت به آنها تحمل ایجاد میشود.



اگر در مصرف داروها مشکلی دارید، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید.

نکات قابل توصیه:

- از قطع ناگهانی مصرف این دارو باید پرهیز شود. قطع مصرف دارو باید به تدریج حداقل طی ۱ هفته انجام شود.
- *دوره درمان با دارو باید کامل شود، این دارو نباید بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف شود*.
- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرفی دارو، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، از دو برابر کردن مقدار مصرفی پرهیزید*.
- به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.
- به علت بروز تاری دید، سرگیجه و خواب آلودگی، هنگام رانندگی یا کار با ماشین که نیاز به هوشیاری دارند باید احتیاط گردد.
- * در صورت نیاز به آزمایشات پزشکی در حین مصرف دارو، حتماً به انجام دقیق آنها توجه داشته باشید

